

# Лаэтрил B<sub>17</sub>

Лаэтрил В<sub>17</sub>  
ТУ У 10.8-25133498-028:2011  
Производитель: СП «НТЦ «Юнис».  
Тел.: +38 044 332-37-76  
Веб-сайт: <http://www.b17.com.ua/>  
Электронпочта: [laetrite@yandex.ua](mailto:laetrite@yandex.ua)

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Прочитайте внимательно данный листок-вкладыш перед использованием средства. Сохраняйте листок-вкладыш. При необходимости прочитайте его повторно.**

**Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.**

**Состав.** Сферичная прозрачная оболочка. Содержание капсулы – невысокая светлая жидкость, без запаха и с приятным маслянистым вкусом. В состав Лаэтрил В<sub>17</sub> входит: масло ядер абрикосовых косточек первого отжима, масло виноградных косточек, сладкого и горького миндаля. Содержит 48-54 % линолевой, 20-34 % линоленовой, 4-7 % пальмитиновой жирных кислот, до 30 % глицеридов стеариновой, олеиновой и эруковой кислот, лецитин, 0,5% фитостерин, флавоноиды, витамины А, В, С, Е и РР, минеральные вещества. Одна капсула Лаэтрил В<sub>17</sub> включает 4-5мг активного вещества – лаэтрила.

**Свойства.** Лаэтрил В<sub>17</sub> регулирует работу клеточных мембран, выводит из организма продукты окисления, укрепляет иммунитет, приостанавливает развитие онкологических заболеваний, оказывает прямое воздействие на опухоли и метастазы, оказывает профилактическое воздействие сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза вен, катаракты, венозных заболеваний, артрита, гипертонии.

Лаэтрил В<sub>17</sub> является хорошим источником витаминов и минералов. Оно отличается низкой кислотностью и небольшой вязкостью, что способствует легкому проникновению в клетки. Лаэтрил В<sub>17</sub> проявляет омолаживающее, питательное, регенерирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее, действие. Также применяется при гастритах, колитах, запорах. Действует как естественное болеутоляющее средство; улучшает обменные процессы; замедляет процесс старения.

**Принцип действия.** Рак является болезнью дефицита питательных веществ. Дефицитное вещество- часть нитрилицидовой группы-амигдалин, цианидовый гликозид. Молекула В<sub>17</sub> состоит из одного соединения цианида, одного — бензолдегида и двух соединений глюкозы, плотно упакованных вместе. Цианид, запертый в молекулу, химически инертен и не производит никакого эффекта на живые ткани. Вещество, которое может разорвать молекулу В<sub>17</sub> и выпустить цианид- фермент бета-глюкозидаз. Этот энзим присутствует в теле в минимальных количествах, но почти в 100 раз его больше в раковых тканях по сравнению со здоровыми. При взаимодействии В<sub>17</sub> входит в соприкосновение с бета-глюкозидазом в присутствии воды, выпускается цианид и бензальдегид. В результате этого витамин В<sub>17</sub> размыкается в раковой клетке и выпускает в нее ферменты. Результатом синергии этих двух компонентов является гибель раковых клеток.

**Показания к применению.** Рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной или комплексной терапии онкологических заболеваний. А также: укрепление иммунной системы, грипп и острые вирусные заболевания, синдром хронической усталости, укрепление нервной системы, депрессия, тревожность, бессонница, синдром дефицита внимания и гиперактивности, мигрень, головные боли, рассеянный склероз, укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение здоровья кожи, розовые угри, себорейный дерматит, улучшение функций зрения.

**Противопоказания.** Индивидуальная непереносимость компонентов. При приеме больших доз Лаэтрила В<sub>17</sub> следует ограничить употребление продуктов, содержащих амигдалин. Также не следует принимать Лаэтрил В<sub>17</sub> в комбинации с высокими дозами витамина С.

**Дозировка.** Взрослым по 1-2 капсуле, 2 раза в день за 40 минут до приема пищи. Продолжительность – 1 месяц. Дальнейшее применение необходимо согласовать с врачом. Курс следует проходить 2-3 раза в год в зависимости от образа жизни, питания, экологической ситуации региона проживания и прочих факторов.

При подозрениях на заболевания или пагубном влиянии окружающей среды и вредных привычек, – следует принимать по 5 капсул два раза в день за 40 минут до приема пищи. Продолжительность приема – два месяца, перерыв – неделя, затем повторить два месяца по той же схеме. Передозировка Лаэтрила В<sub>17</sub> может вызвать тошноту, головную боль, головокружение, снижение артериального давления, слабость мышц.

**Форма выпуска.** 72 и 132 капсулы в пластмассовом флаконе.

**Условия хранения.** Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше + 25°C.

**Срок годности.** 1 год.

# Лаєтріл B<sub>17</sub>

Лаєтріл В<sub>17</sub>  
ТУ У 10.8-25133498-028:2011  
Виробник: СП «НТЦ «Юніс».  
Тел.: +38 044 332-37-76  
Веб-сайт: <http://www.b17.com.ua/>  
Електропошта: [laetrile@yandex.ua](mailto:laetrile@yandex.ua)

## ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

*Прочитайте уважно цей листок-вкладиш перед використанням засобу. Зберігайте листок-вкладиш. При необхідності прочитайте його повторно.*

*Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.*

**Склад.** Сферична прозора оболонка. Зміст капсули – невисихаюча світло-жовта рідина, без запаху, з приємним маслянистим смаком. До складу Лаєтріл В17 входить: масло адер абрикосових кісточок першого віджиму, виноградних кісточок, солодкого й гіркокого мигдалю.

Містить 48-54% лінолевої, 20-34% ліноленової, 4-7% пальмітинової жирних кислот, до 30% гліцеридів стеаринової, олеїнової і ерукової кислот, лецитин, 0,5% фітостерини, флавоноїди, вітаміни А, В, С, Е і РР, мінеральні речовини.

Одна капсула Лаєтріл В17 включає 4-5мг активної речовини – лаєтріла.

**Властивості.** Лаєтріл В17 регулює роботу клітинних мембран, виводить з організму продукти окислення, зміцнює імунітет, призупиняє розвиток онкологічних захворювань, надає прямий вплив на пухлини і метастази, надає профілактичну дію серцево-судинних захворювань, тромбозу вен, катаракти, венозних захворювань, артриту, гіпертонії.

Лаєтріл В17 є гарним джерелом вітамінів і мінералів. Відрізняється низькою кислотністю і невеликий в'язкістю, що сприяє легкому проникненню в клітини. Лаєтріл В17 проявляє омолоджуючу, поживну, регенеруючу, протизапальну, ранозагоювальну дію. Також застосовується при гастритах, колітах, запорах. Діє як природний беззаспокійливий засіб, покращує обмінні процеси; уповільнює процес старіння.

**Принцип дії.** Рак є хворобою дефіциту поживних речовин. Дефіцитна речовина — частина нітріліцідової групи-амігдалін, ціанідовий глікозид. Молекула В17 складається з одного з'єднання ціаніду, одного — бензолдегіда і двох сполук глюкози, щільно упакованих разом. Ціанід, замкнений в молекулу, хімічно інертний і не робить жодного ефекту на живі тканини. Речовина, яка може розімкнути молекулу В17 і випустити ціанід-фермент — бета-глюкозидаз. Цей ензим присутній в тілі в мінімальних кількостях, але майже в 100 разів його більше в ракових тканинах у порівнянні зі здоровими. При взаємодії В17 входить в зіткнення з бета-глюкозидази в присутності води, випускається ціанід і бензалдегід. В результаті цього вітамін В17 розмикається в раковій клітці і випускає в неї ферменти. Результатом синергії цих двох компонентів є загибель ракових клітин.

**Показання до застосування.** Рекомендується для профілактики і посилення ефекту медикаментозної або комплексної терапії онкологічних захворювань. А також: зміцнення імунної системи, грип та гострі вірусні захворювання, синдром хронічної втоми, зміцнення нервової системи, депресія, тривожність, безсоння, синдром дефіциту уваги і гіперактивності, мігрень, головні болі, розсіяний склероз, зміцнення серцево-судинної системи, поліпшення здоров'я шкіри, рожеві вугри, себорейний дерматит, поліпшення функцій зору.

**Протипоказання.** Індивідуальна непереносимість компонентів. При прийомі великих доз Лаєтріла В17 слід обмежити вживання продуктів, що містять амігдалін. Також не слід приймати Лаєтріл В17 в комбінації з високими дозами вітаміну С.

**Дозування.** Дорослим по 1-2 капсулі, 2 рази на день за 40 хвилин до прийому їжі. Тривалість – 1 місяць. Подальше застосування необхідно узгодити з лікарем. Курс слід проходити 2-3 рази в рік в залежності від способу життя, харчування, екологічної ситуації регіону проживання та інших факторів.

При підозрах на захворювання або згубний вплив навколишнього середовища і шкідливих звичок, – слід приймати по 5 капсул двічі на день за 40 хвилин до прийому їжі. Приймати 2 місяці, перерва – 1 тиждень. Після перерви – повторити протягом 2 місяців за тією ж схемою.

Передозування Лаєтріла В17 может викликати нудоту, головний біль, запаморочення, зниження артеріального тиску, слабкість м'язів.

**Форма випуску.** 72 і 132 капсули в пластмасовому флаконі.

**Умови зберігання.** Зберігати в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище + 25 °С.

**Термін придатності.** 1 рік.